

**EXAMES DISPONIBILIZADOS PARA GUARNIÇÕES EXTERNAS – ATUALIZADO EM 08/02/23**

EXAME	MNEMÔNICO	MATERIAL	PRAZO DE ENTREGA APÓS RECEBIMENTO PELO IBEX	CUIDADOS	SETOR
25 OH VITAMINA D	VIT 25	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ÁCIDO FÓLICO	AFO	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ALFAFETOPROTEÍNA	AFP	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ANTI HIV 1/2	HIV12	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ANTICORPOS ANTI-PEROXIDASES	ATPO	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ANTICORPOS ANTI-TIREOGLOBULINA	ATRG	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO C DA HEPATITE B	AHBCM	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO DA HEPATITE C	AHCV	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE HEPATITE B	AHBS	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO E DA HEPATITE	AHBE	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ANTICORPOS CONTRA HEPATITE B IGM	AHBCM	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A IGM	AHAVM	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A IGG	AHAVG	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ANTI-ESTREPTOLISINA O	ASLO	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ANTÍGENO AUSTRÁLIA HEPATITE B	HBS	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO	CEA	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ANTÍGENO E DA HEPATITE B	HBE	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL

BHCG	BHCG	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
CA 125	CA 125	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
CA 15.3	CA 153	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
CA 19.9	CA 199	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
CHAGAS	CHHA	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
CITOMEGALOVÍRUS IGG	CMVG	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
CITOMEGALOVÍRUS IGM	CMVM	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
CLAMÍDIA IGA	CLAA	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
COMPLEMENTO C3	C3	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
COMPLEMENTO C4	C4	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
COOMBS INDIRETO	COI	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
CORTISOL BASAL	CORT	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
DNA AUTO ANTICORPOS	ADNA	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ELETOFORESE DE PROTEÍNAS	EPT	TUBO GEL 8ML	15 DIAS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
ESTRADIOL	E2	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
FATOR REUMATÓIDE (LÁTEX)	FTR	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
FERRITINA	FER	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
FILARIOSE	MFIL	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL

FTA IGM	FTA	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
FTA IGG	FTA	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
GLOBULINA DE LIGAÇÃO A HORMÔNIOS ESTEROIDES SEXUAIS	SHBG	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
HOMA BETA, ÍNDICE	HOMAB	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
HOMA IR, ÍNDICE	HOMAI	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
HORMÔNIO FOLICULOESTIMULANTE	FSH	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
HORMÔNIO LUTEINIZANTE	LH	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE	TSH	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
HTLV I E II	HTLV	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
IMUNOGLOBULINA A	IGA	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
IMUNOGLOBULINA E	IGE	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
IMUNOGLOBULINA M	IGM	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
INSULINA	INS	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
INSULINA APÓS DEXTROSOL - CURVA DE 3 HORAS	INSU3	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
INSULINA PÓS-PRANDIAL	INSPP	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
<b>PERFIL REUMATOLÓGICO (ASLO, PCR, WALLER-ROSE, FATOR REUMATÓIDE)</b>	PREU	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
PESQUISA DE MALÁRIA	PLAS	TB EDTA 4ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA, ENVIAR EM ATÉ 2 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
PROGESTERONA	PROG	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL

PROLACTINA	PRL	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
PROLACTINA APÓS DILUIÇÃO	PRLDI	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
PROLACTINA POOL	PRLP	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
PROTEÍNA C REATIVA	PTCR	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
PSA LIVRE	PSAL	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
PSA TOTAL	PSA	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
PSA TOTAL E LIVRE	PSALT	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
RUBÉOLA ANTICORPOS IGG	RUBG	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
RUBÉOLA ANTICORPOS IGM	RUBM	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
SHBG	SHBG	TUBO GEL 8ML	6 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
SDHEA	SDHEA	TUBO GEL 8ML	7 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
TESTOSTERONA TOTAL	TESTT	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
TESTOSTERONA TOTAL E FRAÇÕES	TESTF	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
TIROXINA	T4	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
TIROXINA LIVRE	T4L	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
TOXOPLASMOSE IGG	TXG	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
TOXOPLASMOSE IGM	TXM	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
TRIIODOTIRONINA	T3	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL

TRIIODOTIRONINA LIVRE	T3L	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
VDRL (SÍFILIS)	VDRL	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
VITAMINA B12	VTB12	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
WAALER-ROSE	WR	TUBO GEL 8ML	5 DIAS ÚTEIS	APÓS A COLETA DE PREFERÊNCIA EM TUBO COM GEL SEPARADOR, CENTRIFUGAR E ENVIAR EM ATÉ 5 DIAS. MANTER SOB REFRIGERAÇÃO 2-8°C	CENTRAL DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL